



## Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

### PROVA

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM



## PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO Nº 05/2026-FSPSS

### CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA

1) Leia a frase a seguir:

“Uma casa com cachorro é um lar feliz.”

Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação adequada do sentido da frase.

- A) Toda casa com cachorro é feliz.
- B) Casas sem cachorro são infelizes.
- C) O cachorro garante a felicidade da casa.
- D) A presença do cachorro contribui para a felicidade do lar.

2) Assinale a alternativa em que o emprego dos pronomes pessoais está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- A) Entre eu e você, tudo está resolvido.
- B) Isso é para mim fazer.
- C) Ela pediu para eu sair.
- D) Vi ele ontem na rua.

3) Assinale a alternativa que contém duas palavras proparoxítonas.

- A) Anúncio – sinônimos.
- B) Décadas – infância.
- C) Século – consequências.
- D) Fenômeno – histórico.

4) Assinale a alternativa em que a concordância verbal está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- A) Havia muitos processos pendentes.
- B) Fazem anos que trabalho aqui.
- C) Deve haver soluções para o problema.
- D) Existia muitos erros no sistema.

5) Os sinais de pontuação servem para marcar pausas na fala, entonação ou ainda, representar graficamente as emoções e anseios. Assinale alternativa pontuada de modo incorreto.

- A) “Érico Veríssimo foi, um autor bastante popular. Escreveu romances que tratam, do cotidiano da burguesia no sul do Brasil.”
- B) “Em 1963, com direção de Nelson Pereira Santos, foi lançado o filme ‘Vidas Secas’, que foi baseado na obra de Graciliano Ramos.”
- C) “Havia, também, a mobilização crescente do movimento operário, descontente com as duras jornadas de trabalho.”
- D) “Vale notar que, desde os primeiros anos da década de 1950, as cidades brasileiras começaram a crescer de maneira vertiginosa.”



## Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

### PROVA

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM



#### CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

6) O SUS obedece a três princípios doutrinários, a universalidade, a integralidade e a equidade. Tais princípios conferem legitimidade ao SUS. Observe o enunciado: "Seu objetivo é diminuir as desigualdades. As pessoas tem direito aos serviços, porém elas não são iguais e possuem necessidades distintas. Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior." A qual princípio do SUS se refere a afirmação:

- A) Universalização.
- B) Equidade.
- C) Integralidade.
- D) Nenhuma das alternativas está correta.

7) Princípios organizativos são usados pelo SUS para orientar o processo, ou seja, são formas de concretizar o SUS na prática. Aponte a alternativa que não corresponde a um dos princípios organizativos do SUS:

- A) Regionalização.
- B) Descentralização.
- C) Resolubilidade.
- D) Centralização.

8) O SUS tem como objetivo oferecer a toda população brasileira acesso universal, integral e gratuito aos serviços de saúde. São programas e ações do SUS, EXCETO:

- A) Prevenção de Controle HIV/AIDS.
- B) Sistema Nacional de Doação e Transplante de Órgãos.
- C) Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
- D) Programa Nacional de Prevenção de Quedas em Idosos

9) São itens necessários à Estratégia Saúde da Família:

- I - Existência de equipe multiprofissional;
- II – Número suficiente de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para cobrir 100% da população cadastrada (máximo de 450 pessoas por ACS e de 8 ACS por equipe de Saúde da Família);
- III – Equipe de Saúde da Família responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.

Estão CORRETAS as expressões apontadas na alternativa

- A) I e II, somente.
- B) I e III, somente.
- C) II e III, somente.
- D) I, II, III

10) 14. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, o que significa que eles devem ocupar:

- A) 25% das vagas.
- B) 50% das vagas.
- C) 75% das vagas.
- D) 100% das vagas.



## Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

### PROVA

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM



#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, a vacina BCG é indicada para a prevenção de formas graves de tuberculose, especialmente em crianças. Considerando as recomendações oficiais quanto à idade, número de doses e via de administração, assinale a alternativa correta:

- A) Ao nascer, dose única, via intramuscular
- B) Ao nascer, dose única, via intradérmica
- C) Aos 2 meses, dose única, via subcutânea
- D) Ao nascer, duas doses, via intradérmica

12) A vacina pentavalente é utilizada no calendário nacional de imunização infantil e tem como objetivo proteger contra diversas doenças infecciosas de importância em saúde pública. Considerando sua composição e as doenças preveníveis, assinale a alternativa correta:

- A) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b
- B) Sarampo, caxumba, rubéola, hepatite B e tétano
- C) Difteria, tétano, sarampo, rubéola e poliomielite
- D) Hepatite A, hepatite B, tétano, coqueluche e meningite

13) A vacina contra o rotavírus humano é indicada para a prevenção de gastroenterites causadas por rotavírus, sendo aplicada por via oral em crianças dentro de uma faixa etária específica. Considerando as recomendações do calendário nacional de vacinação e as características dessa vacina, assinale a alternativa que apresenta sua principal restrição:

- A) Idade máxima para administração da dose
- B) Aplicação apenas em adultos
- C) Uso exclusivo hospitalar
- D) Administração intramuscular

14) A conservação adequada de vacinas é fundamental para garantir sua eficácia, sendo realizada por meio da rede de frio, que mantém os imunobiológicos em condições ideais de temperatura desde o armazenamento até a administração. Considerando as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), assinale a alternativa que apresenta a faixa de temperatura correta para a conservação de vacinas:

- A) 0°C a 5°C
- B) 2°C a 8°C
- C) -2°C a 2°C
- D) 5°C a 10°C

15) Dona Lúcia é moradora de interior do estado e procurou o posto de saúde para se informar sobre uma vacina que havia sido administrada na sua filha. O técnico de enfermagem que estava na sala de vacina explicou que essa vacina é composta por agentes vivos (atenuados) e tem como excipientes albumina humana, lactose, sorbitol, manitol, sulfato de neomicina e aminoácidos. Também informou que a vacinação é indicada para usuários a partir de 12 meses de idade, por via subcutânea, no volume de 0,5mL, e que está contraindicada para gestante. Diante das características apresentadas pelo técnico de enfermagem, trata-se da vacina

- A) Tríplice Viral.
- B) Hepatite B.
- C) BCG.
- D) Meningocócica



## Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Lei Complementar nº 168/2013 e alterações

### PROVA

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM



16) A administração de medicamentos deve ser realizada de forma segura, para evitar erros que causem danos ao indivíduo. Considerando as vias de administração de medicamentos, é INCORRETO afirmar:

A) O músculo ventroglúteo é a melhor escolha para a administração intramuscular em adultos, pois é de fácil acesso e localização e apresenta menor risco, por ser livre de vasos e nervos importantes. No entanto, na prática, esse músculo ainda é pouco utilizado para administração de fármacos.

B) A via intradérmica é destinada à testes de hipersensibilidade e administração da vacina BCG. Nela, pequenos volumes, comumente menores de 0,5 ml, são introduzidos entre a pele e o tecido subcutâneo, com absorção ultralenta.

C) O medicamento administrado por via endovenosa não tem restrição de volume e sua absorção é rápida. O dispositivo para o acesso venoso, bem como seu calibre, deve ser escolhido a partir da avaliação do profissional, considerando a condição venosa e perfil do indivíduo, local de inserção, finalidade e tempo de utilização da via.

D) A via subcutânea é usualmente indicada para a administração de medicamentos que precisam ser absorvidos lentamente e que tem uso recorrente ou contínuo, como insulinas e heparina. Deve-se sempre realizar a aplicação do medicamento no mesmo local ou área do corpo, pois a lipodistrofia e o endurecimento do tecido na região promovem depósito e ação prolongada da droga.

17) Em relação ao atendimento do técnico de enfermagem a um indivíduo com diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, é correto afirmar:

A) A aferição da pressão arterial (PA) pode ser feita assim que o indivíduo chegar para atendimento, pois novos estudos indicam que a realização de atividade física, o consumo de café e o uso de cigarros imediatamente antes do procedimento não interferem na PA.

B) Para evitar erros na aferição da pressão arterial, é preciso que o profissional estime o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial, que definirá até quando o manguito deve ser inflado (20 a 30 mmHg acima do nível estimado). Contudo, o valor da pressão sistólica será determinado pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff)

C) O indivíduo deve ser orientado quanto aos cuidados com a alimentação, que precisa ser restrita em relação às verduras e legumes, e sobre a importância de evitar a atividade física, visto que ela eleva a PA e aumenta o risco de hiperglicemia.

D) Os cuidados para prevenir o surgimento do pé diabético têm de ser ressaltados pelo profissional. Dentre eles, podemos citar: andar descanso sempre que possível, para evitar atrito com os calçados; lavar os pés com água bem quente; e utilizar cremes hidratantes entre os dedos, para deixar o local úmido.

18) Considerando as disposições acerca das normas e procedimentos para vacinação em crianças, analise as afirmativas a seguir a assinalar (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A vacina da febre amarela é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade.

( ) De acordo com o Ministério da Saúde, o intervalo mínimo entre as doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, deve ser de 4 semanas.

( ) A idade mínima para a administração da primeira dose da vacina Rotavírus Humano (VRH) é de 1 mês e 15 dias e a idade máxima é de 3 meses e 15 dias.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

(A) V – V – V.

(B) V – F – V.

(C) V – F – F.

(D) F – F – V.

